

Carbonero Común *Parus major*

 Chichipán



Foto: Gómez Medel

Identificación

Pequeño y territorial insectívoro de zonas arboladas. Inconfundible por la corbata negra que cruza verticalmente desde la garganta hasta el vientre, más ancha y larga en los machos. De cabeza negra, mejillas blancas y partes inferiores amarillas. Exhibe manto color verde oliva, cola larga azulada, igual que las plumas de vuelo, y bandas alares blancas. Emite un gran abanico de reclamos casi siempre cortos, repetitivos, con un tono metálico y estridentes. Acróbata de los árboles: se descolgará bocabajo si la situación lo requiere y será capaz de adoptar posturas imposibles para alimentarse, descansar o marcar su territorio.

¿Dónde encontrarlo?

Sedentario y ampliamente distribuido por la provincia de Guadalajara y toda la Península. Gran adaptabilidad, aparecerá en cualquier ambiente arbolado o arbustivo, sin excluir zonas de matorral o monte bajo. Presente también en parques y jardines. Es una de las aves que más se benefician de la instalación de cajas nido y comederos artificiales para aves.

¿Sabías que...

La agresividad del carbonero común le lleva en muchas ocasiones a ocupar cajas nido con puestas de especies como el herrerillo común ya en proceso de incubación. Esta conducta ha sido observada por el Grupo de Anillamiento Aegithalos en la comarca de Brihuega, donde se han dado casos en los que los huevos originales han llegado a eclosionar, siendo los pollos de herrerillo resultantes criados por padres carboneros.

Hábitat	Urbano	Fluvial	Humedal	Cultivo y Matorral	Bosque							
Presencia en Guadalajara	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Temporada del año	INVERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO		